








Geologische Spezialkarte der Umgebung der Schlagmann Baustoffwerke Zeilarn M : 1 : 5.000

Quartär, Holozän




	anthropogene Aufschüttung
	Talauen, sandig - kiesig – lehmige Abschwemmmassen
	jüngere Talauie des Tanner Baches (nur südlich Gasteig)
	ältere Talauie des Tanner Baches (nur südlich Gasteig)

Quartär, Pleistozän

	Niederterrasse des Tanner Bachs, nur südlich Gasteig
	Hochterrassenrest zwischen Tanner Bach und Türkenbach
	Lehm, Lößlehm, Fließerdien, schluffig – tonig – sandige Deckschichten, stellenweise kiesig

Jungtertiär, Obermiozän, Sarmat – Pannon

Obere Süßwassermolasse, Südlicher Vollschofter - Hangendserie

	„Mergel“, tonig – sandig – kalkige Schluffe Auenfazies, stellenweise kohleführend
	Sand – Mergel - Wechselfolgen
	Kies und Sand, Stromrinnenfazies der Salzach – Enns - Schüttung unterhalb 425 m NN z.T. Blockkies (Südlicher Vollschofter), oberhalb 470 m NN stark verwitterte Feinkiese

Jungtertiär, Obermiozän, Ottnang – Karpat

	Mergel der Süß-Brackwassermolasse (nur im Profil)
---	---

Kartengrundlage: Höhenflurkarte M : 1 : 5.000 (2009)

A. Ulbig, 2012